


Seminario Gisma  
Perugia 8, 9 marzo 2012

# Cancri Intervallo: l'esperienza umbra

A caccia dell'indicatore  
sbagliando si impara



**Marco Petrella UOS Epidemiologia Ausl 2 Umbria**



VIAGGIO ACCANTO A LORO  
PER SEMPRE MIMOSE IN FIORE



Seguo questa donna negativa per vedere cosa gli succede nell'intervallo

# La prima volta

- I negativi del III round
- Anni di screening: 2002, 2003
- Periodo di osservazione: dal 2002 al 2005
- Fonte dei casi incidenti: SDO, complete della mobilità inter-regionale
- Disponibilità della fonte nella sua interezza: 2006
- Elaborazioni e report: fine del 2006
- Confronto SDO – RTU nel 2008


# Risultati sul primo anno

Classi d'età	Casi negativi a 12 mesi	Incidenza x 100000 1994-96	Casi attesi a 12 mesi	Cancri Intervallo 0 - 12 mesi	Tasso proporzionale di cancro intervallo a 12 mesi
50 - 54 a.	5955	219,8	13,09	3	22,9%
55 - 59 a.	6853	191,5	13,12	4	30,5%
60 - 64 a.	6706	194,2	13,02	3	23,0%
65 - 69 a.	6070	239,9	14,56	4	27,5%
70 - 74 a.	538	247,0	1,33	1	75,3%
Totale	26121		55,13	15	27,2%



# Risultati sul secondo anno

Classi d'età	Casi negativi a 24 mesi	Incidenza x 100000 1994-96	Casi attesi a 24 mesi	Cancro Intervall o 13 - 24 mesi	Tasso proporzionale di cancro intervallo a 24 mesi
50 - 54 a.	5202	219,8	11,43	9	78,7%
55 - 59 a.	6935	191,5	13,28	6	45,2%
60 - 64 a.	6615	194,2	12,85	5	38,9%
65 - 69 a.	6167	239,9	14,80	1	6,8%
70 - 74 a.	1096	247,0	2,71	0	0,0%
Totale	26014		55,06	21	38,1%



# La seconda volta

- I negativi del IV round
- Anni di screening: 2004, 2005
- Periodo di osservazione: dal 2004 al 2007
- Fonte dei casi incidenti: RTU
- Disponibilità della fonte nella sua interezza: 2010
- Elaborazioni e report: inizio del 2011

# I risultati per il IV round

- Incidenza proporzionale a 1 anno: 18,6% (10 casi)
- Incidenza proporzionale a 2 anni: 34,5% (16 casi)
- Nel biennio sono registrati 17 casi screening detected perché invitati in anticipo al round successivo e 5 individuati tramite richiamo anticipato (Incidenza proporzionale totale nel biennio: 40,6%)



Seguo questa donna con diagnosi di tumore per vedere cosa ha fatto nell'intervallo

# Proposta per la survey

- Censire i **casi incidenti** nell'anno in esame (screening detected, diagnosticati dallo stesso centro fuori dal percorso screening, recuperati attraverso le SDO)
- Individuare i casi **non screening detected** con precedente esame negativo
- Effettuare **la revisione** su questi casi nella modalità resa possibile dalla presenza o meno della documentazione completa

... e qui l'epidemiologo  
vorrebbe lasciare il  
dovuto spazio ai  
radiologi ...

**GRAZIE**

