


### Programmi di screening e numero casi

### Dati: SQTM Screening Italia 2000-2006

3548



### Programmi di screening e casi per regione

### Dati: SQTM Screening Italia 2004-2006

#### Programmi di screening e casi

|                      | 2004 |      | 2005 |      | 2006 |      |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Piemonte/Val d'Aosta | 10   | 1153 | 9    | 1079 | 9    | 1107 |
| Lombardia            | 1    | 51   | 1    | 138  | 1    | 139  |
| Veneto               | 12   | 369  | 12   | 432  | 10   | 392  |
| Emilia Romagna       | 9    | 765  | 10   | 866  | 11   | 992  |
| Toscana              | 1    | 213  | 9    | 522  | 9    | 526  |
| Lazio                | 8    | 297  | 6    | 239  | 6    | 286  |
| Puglia               | -    | -    | -    | -    | 1    | 106  |
| Sicilia              | 1    | 10   | -    | -    | -    | -    |
|                      | 42   | 3008 | 47   | 3276 | 47   | 3548 |

### Numero di casi per regione

## Dati: SQTM Screening Italia 2006

66 Valle d'Aosta

1041 Piemonte

139 Brescia

392 Veneto

992 Emilia Romagna

526 Toscana

286 Lazio


106 Lecce

3548




### Diagnosi istopatologica definitiva

### Dati: SQTM Screening Italia 2006




### Intervento conservativo in casi pT1

Calcola la proporzione di pazienti con diagnosi di carcinoma mammario invasivo di diametro patologico fino a 20 mm (pT1) unifocale, operate con intervento di tipo conservativo, sul totale delle donne operate con la medesima diagnosi.




### Intervento conservativo in casi pT1

Dati: SQTM Screening Italia 2000-2006




### Diagnosi preoperatoria nei cancri (C5, B5)

Calcola la proporzione di pazienti operate per cancro invasivo o in situ che avevano avuto una diagnosi pre-operatoria citologica o istologica positiva per cancro, sul totale di pazienti operate per cancro invasivo o in situ per le quali si dispone dell'informazione sul fatto che abbiano eseguito o non abbiano eseguito agoaspirato mammario oppure agobiopsia (tru-cut, core biopsy) prima dell'intervento.




### Diagnosi preoperatoria nei cancri (C5, B5)

Dati: SQTM Screening Italia 2000-2006




### Stadiaz. ascellare con solo linf. sentinella negli N0


Indica la proporzione delle pazienti con lesioni invasive pN0 sulle quali è stato eseguito il solo linfonodo sentinella sul totale delle pazienti sottoposte a stadiazione ascellare.



# Stadiaz. ascellare con solo linf. sentinella negli No Dati: SQTM Screening Italia 2006




# Stadiaz. ascellare con solo linf. sentinella negli N0 Dati: SQTM Screening Italia 2001-2006




### Ricostruzione immediata negli N0 (CDIS e pT1)

Calcola la proporzione di pazienti (ca invasivi o in situ) mastectomizzate N0 con lesioni in situ, microinvasive o invasive con lesione inferiore ai 3 cm per le quali è stata eseguita ricostruzione immediata, sul totale delle pazienti per le quali è disponibile l'informazione.




#### Ricostruzione immediata

### Dati: SQTM Screening Italia 2000-2006



### www.qtweb.it/gisma2007




### Proposta:


usare lo strumento anche per la raccolta dei dati FONCAM?



### Accesso da parte di coordinatore regionale




### Rapporti sulla correttezza dei dati




### Valutazione indicatori a livello regionale



### Confronto risultato regionale con benchmark nazionale



### Indicatore regionale stratificato per programma



### Documentazione degli indicatori

